





Jetrene presadnice raka pluća

Presadnice kod NSCLC



Približno **4 od 10** osoba s rakom pluća dobile su dijagnozu u uznapredovanom stadiju¹


Uobičajena mjesta presadnica¹



Kosti, pluća i mozak uobičajena su mjesta presadnica raka pluća, nakon kojih slijede jetra i nadbubrežne žlijezde

Presadnice u jetri mogu upućivati na loše izgleda za preživljenje

Do trenutka kad zahvati jetru, vrlo je vjerojatno da će rak u bolesnika već **zahvatiti mozak i kosti**; veći broj lokacija presadnica povezan je s lošijim ishodima za preživljenje²



Bolesnici s presadnicama trebaju **brzi pristup liječenju** kako bi se spriječilo daljnje napredovanje bolesti

Liječenje je u ovoj fazi uglavnom palijativno

Potrebno je provoditi terapije koje bi mogle pomoći u **ublažavanju simptoma** kod osoba s presadnicama u jetri³



Bol ispod rebara, u trbuhu



Gubitak apetita



Mučnina



Žutica ako su žučni kanali začepljeni

Cilj liječenja je **održavati normalan rad jetre**



Neki bolesnici s NSCLC-om ne mogu nastaviti kemoterapije zbog oštećene funkcije jetre¹



Pojava imunoterapije i drugih vrsta ciljane terapije mogla bi dovesti do novih mogućnosti personaliziranog liječenja ovih bolesnika



Tvrtka Roche posvećena je daljnjem istraživanju kako bi produbila naše razumijevanje raka pluća i pronašla mogućnosti liječenja svih vrsta raka pluća te poboljšala ishode bolesnika

Referencije

- Tomohiro T et al. Specific organ metastases and survival in metastatic non-small-cell lung cancer, *Mol Clin Oncol*. 2015; 3(1):217–221.
- Chang Y et al. The impact of de novo liver metastasis on clinical outcome in patients with advanced non-small-cell lung cancer. *PLOS ONE*. 2017;12(6).
- Very Well Health. How Lung Cancer Spreads to the Liver. [Internet; cited 2019 Oct 09]. Available from: <https://www.verywellhealth.com/lung-cancer-spread-to-the-liver-2249263>.